Posicionamiento



Residuos

Respetando las buenas prácticas agrícolas y las condiciones de aplicación indicadas más arriba, la suma de los residuos (flonicamid + TFNG + TFNA) estarán muy por debajo del LMR.



Flonicamid suma

Registros en Hortícolas

APLICACIÓN	CULTIVO	DOSIS (g/Hl)	LMR (mg/kg)	P.S. (días)
Cucurbitáceas de piel comestible	CALABACÍN	10	0.5	7
	PEPINO			
Cucurbitáceas de piel no comestible	CALABAZA	10	0,4	1
	MELÓN			
	SANDÍA			
Tomate	TOMATE	10 - 12	0,3	1

Teppeki está registrado también en los siguientes cultivos:
frutales (peral, melocotón, nectarina y ciruelo), cítricos, algodonero, arroz, ornamentales herbáceas y ornamentales leñosas

Belchim Crop Protection España
Avda. de Europa, 24 | Edif. Torona, B 3ªA | Parque empresarial La Moraleja | 28108 Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 010 64 17 | Fax: +34 91 010 61 16 | www.belchim.es

Teppeki® : Producto y Marca Registrada por ISK BIOSCIENCES

teppeki®

Hortícolas **sin pulgón**

BELCHIM CROP PROTECTION

Hortícolas sin pulgón

Único

Flonicamid : una molécula única

Teppeki® es un aficida sistémico (50% de Flonicamid), que pertenece a la familia de las Piridinocarboxamidas.



Flonicamid : un modo de acción único

Actúa como inhibidor de la alimentación, **único representante del grupo 29 (clasificación IRAC).**
Actúa por contacto e ingestión. Tiene sistemia ascendente y efecto translaminar.



efecto translaminar



sistemia ascendente

Respetuoso



Con los auxiliares

Con el operario

Con el medio ambiente



Eficaz

Teppeki® es altamente eficaz frente a un amplio rango de especies de pulgones diferentes



Flonicamid provoca una rápida interrupción de la alimentación de los pulgones, que se traduce en la falta de producción de melaza.



Pulgones absorbiendo la savia

Interrupción de la alimentación en 1 hora

Muerte del pulgón

Teppeki ♥ auxiliares

Especie

Adalia bipunctata
Amblyseius andersoni
Amblyseius degenerans
Amblyseius swirskii
Anagyrus pseudocci
Anthocoris nemoralis
Aphidius colemani
Aphidoletes aphidimyza
Aphytis spp.
Apis mellifera
Atheta coriaria
Bombus terrestris
Chrysoperla carnea
Coccinella septempuntata
Cryptolaemus montruizieri
Encarsia formosa
Episyrphus balteatus
Euseius stipulatus
Hypoaspis miles
Hypoaspis miles & aculeifer
Kampidromus aberrans
Macrolophus caliginosus
Neoseiulus californicus
Neoseiulus cucumeris
Nesidiocoris tenuis
Orius laevigatus
Phytoseiulus persimilis
Transeius montdorensis
Typhlodromus pyri